

國立暨南國際大學麻疹個案處理標準作業流程圖

- 一、麻疹好發於春夏二季，接獲通報麻疹確診個案通知。
- 二、衛保組現場接獲個案有發高燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽和口腔內頰側黏膜出現柯氏白色斑點，麻疹的紅疹最先出現在兩頰與耳後再擴及軀幹；立即給予個案口罩使用，並立即送醫後確診為麻疹病例。

處理步驟(以下內容統一向衛保組→學務長→校長報告)：

- 一、立即通報校安中心(專線 0932576184 分機 2310)。
- 二、於 24 小時內建置個案及接觸者基本資料，完成「國立暨南國際大學健康管理與服務記錄表」，包括：
 - (一)至校務系統蒐集個案課表及同學名冊。
 - (二)電洽本校住服組(分機:2360)，瞭解個案住宿與否及同寢室學生資料。
 - (三)由校務系統查詢學生及家長聯絡電話。
 - (四)電洽系辦公室蒐集導師及授課老師聯絡電話。
- 三、向學生、學生家長連繫病情診斷，給予醫療建議、衛教及心理支持。
- 四、衛教學生於公眾場所請戴上口罩(空氣與飛沫傳染)、保持所處環境空氣通暢(空氣傳染)，寢室之桌面、門把、電源開關以一般市售的漂白水，以 100 倍的清水稀釋來擦拭；麻疹的傳染期為出疹前後 4 日，請在家休養按醫囑服藥；出疹至少 4 天後即不具傳染力才可返回學校上課。

衛保組持續追蹤學生病情
至康復返校上課後結案

備註：

- 一、接觸者處理：積極尋找接觸者（出疹前、後 4 天內），因為若接觸麻疹病人後 72 小時內接種 MMR 疫苗，或 6 天內進行肌肉注射免疫球蛋白，尚有可能預防麻疹發生。
- 二、麻疹為高傳染性疾病，出疹前後 4 天均具傳染力。師生如有發燒、鼻炎、結膜炎、紅疹等症狀，應儘速就醫，並主動告知醫師相關旅遊及暴露史。
- 三、師生出國前可至疾管署網站(<https://reurl.cc/qz2ZvE>)查詢欲前往之地區疫情風險，師生出國期間應留意手部衛生，進出公共場所或人多擁擠的地方建議佩戴口罩，並注意呼吸道衛生及咳嗽禮節等個人衛生行為，回國後如出現疑似症狀，請佩戴口罩儘速就醫並告知醫師相關旅遊史。