

諾羅病毒預防方法

1 勤以肥皂水洗手
如廁後、進食或準備食物之前，
用肥皂水澈底洗手
(酒精性乾洗手無效)



2 澈底煮熟
所有食物(尤其是貝類)，
應澈底清洗及煮熟



3 環境消毒
汙染衣物、床單立即更換，
馬桶、門把、玩具物品
用漂白水擦拭(1000ppm)



4 嘔吐、排泄物處理
糞便、嘔吐物用漂白水消毒
(5000ppm)再沖入下水道，
處理時戴手套與口罩



5 生病在家休息
有症狀的人停止處理食物，
餐飲業員工應於症狀解除
48小時後才可上班



詳見疾病管制署「諾羅病毒(Norovirus)感染控制措施指引」



衛生福利部疾病管制署
TAIWAN CDC



www.cdc.gov.tw



1922防疫達人 www.facebook.com/TWCDC

疫情通報及關懷專線： 1922

廣告

得到病毒性腸胃炎 要注意什麼？

注重個人衛生，防止病毒再向外傳染

— 補充水分及電解質，避免脫水

— 用肥皂勤洗手

— 稀釋漂白水清洗消毒弄髒的衣物及環境

— 腹瀉嘔吐症狀解除後2日才能接觸健康的人與料理食物

— 請假在家休息，不上班上課



漂白水如何稀釋配製呢？

1. 環境消毒—0.1%漂白水泡製方式：
【200cc市售漂白水+10公升清水】
2. 嘔吐物及排泄物消毒—0.5%漂白水泡製方式：
【1000cc市售漂白水+10公升清水】
3. 稀釋的漂白水，應當天配製並標示日期名稱，未使用的部分在24小時後應丟棄。



嘔吐物及排泄物該如何消毒呢？

- 1 戴上口罩及手套
- 2 用0.5%漂白水灑在嘔吐物或排泄物上
- 3 用拋棄式紙巾、抹布或舊報紙覆蓋後清除
- 4 用0.1~0.5%漂白水由外往內擦拭汙染區
- 5 用0.1~0.5%漂白水由外往內大範圍輕灑
- 6 30分鐘後用清水擦拭或沖洗



www.cdc.gov.tw



1922防疫達人
www.facebook.com/TWCDC

疫情通報及關懷專線 : **1922** 104.07 廣告

注重個人衛生健全遠離病毒性腸胃炎

